

TURKOVAC UYGULAMA KURALLARI

Aşı Uygulaması:

TURKOVAC 3 mcg/0,5 ml Pandemi COVID-19 Aşısı;

- ◆ 5 dozluk kullanıma hazır 2,5 mL flakonda enjektörsüz olarak sunulmaktadır.
- ◆ Uygulama standart aşı enjektörü ile yapılmalıdır.
- ◆ Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- ◆ 1 doz 0,5 ml'dir.
- ◆ 18 yaş ve üzerindeki kişilere 0,5 ml olarak 90° açı ile kas içine (intramusküler) olarak uygulanır. 18 yaş altındaki bireylerde uygulanmasına ilişkin bilgiler güncel veriler ışığında değerlendirilecektir.
- ◆ Aşı sonrası istenmeyen etki takibi yapılabilmesi için tercihen sol koldan uygulanması tercih edilir.
- ◆ Diğer aşıların eşzamanlı (öncesinde, sonrasında veya aynı anda) uygulanmasının bu aşının immünojenitesi üzerindeki etkisine ilişkin klinik çalışma verisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte; daha önceki inaktif aşı uygulamaları dikkate alınarak kişinin COVID-19 ve risk grubu aşılama için risk grubunda yer alma durumu da değerlendirilerek;
 - Mevsimsel influenza, pnömokok, meningokok ve diğer inaktif ve canlı rutin aşılar arasında (öncesinde ve sonrasında) süre bırakılmaksızın uygulanabilir.
 - Diğer COVID-19 Pandemi Aşıları ile arasında Bakanlığımızca daha önce bildirilen en az ve en çok bırakılması gereken süreler aynı şekilde geçerlidir. Bu süreler güncel bilgilere göre değişebilecektir.
- ◆ Aşı kişiye oturur durumdayken uygulanmalıdır. Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve kişi 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Alerji hikayesi olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.
- ◆ Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşılamaya ilişkin bilgiler "AŞILA" mobil uygulamasına erişilerek kaydedilecektir.
- ◆ Pandemi COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir.
- ◆ İlave bilgiler için aşı kutularından çıkan "Aşı Kullanma Talimatı"na bakılabilir veya Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'na başvurulabilir.

Aşı Takvimi:

TURKOVAC 3 mcg/0,5 ml Pandemi COVID-19 aşısı;

- ◆ 18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanacaktır.
- ◆ Aşının her iki dozu da aynı pandemi aşı ile uygulanmalıdır. Hatırlatma dozu olarak uygulanması halinde tek doz olarak uygulanması yeterlidir.
- ◆ İkinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır.

- ◆ Gebelikte uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Daha önceki pandemik inaktif aşılarından gelen tecrübelerle dayanarak, COVID-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan gebelere uygulanabilir. İlk trimesterde olmak aşu uygulanmasına engel değildir.
- ◆ Emzirme döneminde uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Daha önceki pandemik inaktif aşılarından gelen tecrübelerle dayanarak, COVID-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan gebelere uygulanabilir.
- ◆ Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşuyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağılı olarak aşu olama kararı verilir.
- ◆ İmmün suprese kişilere aşu yanıtının en iyi olabileceğı zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağılı olarak aşu uygulanmalıdır. Dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanmalıdır.
- ◆ Trombositopeni ve kanama bozukluğı olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.

Kontrendikasyonlar:

- ◆ Aşuın içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerji/anafilaksi öyküsü.
- ◆ Pandemiik aşuın ilk dozu sonrasında anafilaksi öyküsü varlığında ikinci doz uygulanmaz.

Aşuın Ertelenmesi Gereken Durum (Geçici Kontrendikasyon):

- ◆ 38°C ve üzerinde ateşi olan kişilere,
- ◆ Henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklar,
- ◆ Kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenmelidir.

Açılan Flakonun Kullanım Süresi:

TURKOVAC 3 mcg/0,5 ml Pandemiik COVID-19 aşısı beş(5) dozlu flakonlarda sunulmaktadır. Flakon açıldıktan sonra en geç 8 saat içerisinde kullanılacak şekilde planlanma yapılmalıdır. 8 saatin sonunda flakonda aşu kaldıysa kullanılmamalı ve kalan aşu dozları uygun şekilde imha edilmelidir.

Soğuk Zincir:

TURKOVAC 3 mcg/0,5 ml Pandemiik COVID-19 aşısı;

- ◆ Donmaya ve gün ışığına karşı duyarlıdır; aşuın donmamasına dikkat edilmelidir. +2-+8 °C'de saklanmalıdır.
- ◆ Aşu dolabının herhangi bir rafında muhafaza edilebilir.
- ◆ Aşu dolabı özelliğı bulunmayan no-frost dolaplarda ise dolap iç cidarına temas etmeyecek ve üfleme kanallarının önünde olmayacak şekilde tercihen üstten ikinci rafta ve rafın kapağına yakın tarafında saklanması gereklidir.
- ◆ Dolap içerisinde tercihen donma göstergesi bulunmalıdır.
- ◆ Aşu uygulanmadan önce flakonda süt beyaz renkte bulunmaktadır. Tabaka halinde çökeltiler çalkalama ile giderilebilir, çalkalamadan sonra tortu veya kümeleşme kalmamalıdır.
- ◆ Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesine uygun soğuk zincir sağlanmalıdır.